

# OVACE EN LACTANTES

## OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPOS EXTRAÑOS

[www.estalsalud.com](http://www.estalsalud.com)

INSTAGRAM: EstalSalud

Según la *Asociación Española de Pediatría (AEP)*, se considera lactante el bebé desde el primer día de vida hasta las 24 meses de su nacimiento.

Lactante menor: 1-12 meses de vida.

Lactante mayor: 1-2 años.

### MODO DE ACTUACIÓN:

**1** El bebé tose enérgicamente y llora de modo entrecortado. La tos es eficaz.

**1** Incorporarle. Dejarle toser NO dar golpes en la espalda. Intentar visualizar el objeto dentro de la boca. Sacarlo de dentro afuera.



**2** La víctima deja de toser o la tos es ineficaz, no llora. Puede empezar a presentar cianosis (coloración azulada).

**2** Ponerle boca abajo sujetando su cabecita con nuestra mano y su cuerpo con el nuestro brazo. Darle 5 golpes en la espalda. A continuación dar 5 golpecitos en el tórax con dos dedos hasta expulsar el objeto o quedarse inconsciente.



**3** La víctima pierde la consciencia. LLAMAR al 112.

**3** Ponerle boca arriba en un superficie dura y realizar Reanimación Cardiopulmonar.



\*Tanto los golpes en la espalda como las compresiones en el tórax deben adaptarse a la edad del bebé.

\*Si en algún momento el objeto es observable y fácilmente extraíble, introducir el dedo en gancho y producir un barrido para extraerlo.



\*FOTOS OBTENIDAS DE:

SANITAS <https://www.youtube.com/watch?v=IEJ9EIU8HwY>

INFORMACIÓN E ILUSTRACIONES :Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria